





PHYSIO
ACTIVATEUR®
TECHNOLOGIE

GOEMAR

Raizofos®

FISIOACTIVADOR DE RAICES

Plus





CARACTERÍSTICAS

Raizofos posee la señal que sus cultivos necesitan para nutrirse, producir y defenderse.

Los efectos bióticos y abióticos a los que se encuentra sometido su cultivo, sumados a la bioestimulación y al uso de reguladores de crecimiento tradicionales pueden causar alteraciones por fisiopatías y desbalances hormonales en sus plantas, infiriendo directamente en la baja de producción.

Los fisioactivadores de GOEMAR envían la información correcta para el restablecimiento de todas las funciones fisiológicas de su cultivo interviniendo en:

- **Nutrición:**

Activando enzimas que permiten un uso más eficiente de los fertilizantes y proporcionan beneficios cuantitativos y cualitativos en cosecha.

- **Reproducción (expresión del potencial de calidad):**

Incremento en la tasa de formación de poliaminas para floración.

Mejora la germinación y elongación de tubo polínico, incrementa la multiplicación celular.

- **Defensas:**

Aumenta la capacidad de autodefensas de la planta mediante la activación del sistema de resistencia adquirida basada en el mecanismo de herencia poligénica que las plantas poseen.

Mayor formación de compuestos fenólicos y taninos así como de enzimas quitinasa y gluconasas. Esto genera la inhibición de enzimas pectolíticas responsables de la degradación vegetal.

DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS/HA	MÉTODO DE APLICACIÓN
Papa	2,5 - 3 Litros	Aplicar junto con Humita-15 8 días después del 100% de la germinación en drench.
Arveja, Haba, Frejol	2 - 2,5 Litros	Aplicar 8 a 15 días después del 100% de la germinación de las semillas en drench.
Cebolla	2,5 - 3 Litros	Aplicación de 8 a 15 días después del trasplante, luego aplicaciones continuas en drench cada 21 a 30 días junto con Humita-15.
Tomate, Pimiento	2,5 - 3 Litros	8 días después del trasplante en drench.
Fresa	1,5 - 2 Litros	Aplicar una vez al mes a partir del octavo día después de la siembra junto con Humita-15.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

ACTIVO	CONCENTRACIÓN g/Lt
GA142	280 gr
P ₂ O ₅	130 gr
K ₂ O	50 gr

PRODUCIDO POR:



CERTIFICACIÓN ORGÁNICA



FORMA PARTE DE:



DISTRIBUIDO POR:



Un compromiso con el Agro



PHYSIO
ACTIVATEUR®
TECHNOLOGIE

GOEMAR

Raizofos®

FISIOACTIVADOR DE RAICES

Plus





CARACTERÍSTICAS

Raizofos posee la señal que sus cultivos necesitan para nutrirse, producir y defenderse.

Los efectos bióticos y abióticos a los que se encuentra sometido su cultivo, sumados a la bioestimulación y al uso de reguladores de crecimiento tradicionales pueden causar alteraciones por fisiopatías y desbalances hormonales en sus plantas, injiriendo directamente en la baja de producción.

Los fisioactivadores de GOEMAR envían la información correcta para el restablecimiento de todas las funciones fisiológicas de su cultivo interviniendo en:

• **Nutrición:**

Activando enzimas que permiten un uso más eficiente de los fertilizantes y proporcionan beneficios cuantitativos y cualitativos en cosecha.

• **Reproducción (expresión del potencial de calidad):**

Incremento en la tasa de formación de poliaminas para floración.

Mejora la germinación y elongación de tubo polínico, incrementa la multiplicación celular.

• **Defensas:**

Aumenta la capacidad de autodefensas de la planta mediante la activación del sistema de resistencia adquirida basada en el mecanismo de herencia poligénica que las plantas poseen.

Mayor formación de compuestos fenólicos y taninos así como de enzimas quitinasa y gluconasas. Esto genera la inhibición de enzimas pectolíticas responsables de la degradación vegetal.

DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS/HA	MÉTODO DE APLICACIÓN
Banano	0,5 - 3 Lts	Aplicar Raizofos junto con Humita•15 primera aplicación a entrada de lluvias, segunda aplicación salida de lluvias.
Cacao, Mango, Maracuyá, Papaya.	0,25 – 3 Lts	Aplicar 3 a 4 veces al año junto con Humita•15 antes o después de cada fertilización.
Arroz	1 – 1,5 Lts	Aplicar junto con Humita•15 15 días después de la germinación o trasplante.
Maíz	1 – 1,5 Lts	Aplicar 21 días después de la emergencia junto con Humita•15.
Cebolla	1,5 – 2 Lts	Aplicar una vez al mes a partir del octavo día después de la siembra junto con Humita•15.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

ACTIVO	CONCENTRACIÓN g/Lt
GA142	280 gr
P ₂ O ₅	130 gr
K ₂ O	50 gr

PRODUCIDO POR:



CERTIFICACIÓN ORGÁNICA



FORMA PARTE DE:



DISTRIBUIDO POR:



Un compromiso con el Agro