

FICHA TÉCNICA MERIT AMARILLO

1. NOMBRE COMERCIAL

MERIT AMARILLO

2. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

 **Sumitomo Corporation del Ecuador S.A.**

Avenida Amazonas No. 4080 y calle UNP. Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, Piso 7, Quito Ecuador. Telf. 593 (2) 243 – 2775/ 243-2457. P.O.Box: 17-01-3279.
E- mail: pablo.quirola@sumitomocorp.com

3. NÚMERO DE CÓDIGO

03048844

4. TIPO DE PRODUCTO

Fertilizante foliar.

5. COMPOSICIÓN

Nitrógeno(N)	3%
Fósforo (P ₂ O ₅)	7%
Potasio (K ₂ O)	6%
Manganeso (Mn).....	0.1%
Boro (B).....	0,2%
Hierro (Fe).....	0,08%
Cobre (Cu).....	0.05%
Zinc (Zn).....	0.05%
Molibdeno.....	0.07%

6. FORMULACIÓN

Líquido soluble

7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FLORACIÓN:

MERIT AMARILLO, es un fertilizante completo para aspersiones al follaje que permite balancear los desequilibrios existentes en el suelo y proporcionar una adecuada nutrición en las plantas; ayuda o reduce el problema de plagas y enfermedades por la presencia de fósforo orgánico (poli fosfito), que pasa a formar parte de las paredes celulares, haciéndolas más resistentes e induce a la formación de fitoalexinas.

8. MODO DE EMPLEO

Aplicar por vía foliar, disolviendo primeramente en un recipiente pequeño la dosis recomendada de MERIT AMARILLO, agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad de volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. Aplicar a bajas temperaturas. Ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

9. DOSIS GENERAL

500 g (413 cm³) de MERIT AMARILLO en 200 lt de agua.

10. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN GENERAL

ÉPOCA Y FRECUENCIA

CULTIVO	NÚMERO DE APLICACIONES	INTERVALOS (DÍAS)	ÉPOCA
Rosas, Flores de verano	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Fresas	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Cacao	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Gramíneas (Maíz, Arroz)	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Palma aceitera	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Hortalizas	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Frutales	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Papas	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Banano	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Soya	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración
Papaya	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de floración

12. COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes de uso común; a excepción de los productos de reacción alcalina.

13. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No coma, beba o fume durante las aplicaciones.
- Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersión, usar traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores.
- Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón después de cada uso.
- Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación.