



## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### Ingredientes activos:

**Cymoxanil:** 1-(2-ciano-2-metoxi-iminoacetil)-3-etilurea:..... **80 gr/kg.**

**Mancozeb:** Producto de la coordinación del ion zinc con el etilenbisditiocarbamato de manganeso:.... **640 gr/kg.**

### GENERALIDADES

**MOXAN MZ WP**, es un fungicida formulado como una mezcla de dos ingredientes activos diferentes: una parte protectante como es el “MANCOZEB” y otra sistémica curativa como es el “CYMOXANIL”. Esto le confiere un doble modo de acción: protectante o preventivo y sistémico curativo, siendo más eficiente en el manejo de las enfermedades.

**MOXAN MZ WP**, posee una acción preventiva y de post-infección, cuando el hongo está en incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad.

DOSIS DE MOXAN MZ 72:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha o g/Hl)	OBSERVACIONES	CARENCIA (Días)
TOMATE	Tizón tardío	1.5 - 2.0	Aplicar en condiciones predisponentes a las enfermedades, después del trasplante y con plantas arraigadas. Se puede repetir cada 7 a 10 días, si persisten las condiciones.	10
	Cancro del tallo Tizón temprano Alternariosis	ó 100 - 150		
PAPA	Tizón tardío Tizón temprano	1.5 - 2.0 ó 100 - 200	Aplicar en condiciones predisponentes y una vez las plantas arraigadas de unos 10 cm de altura. Repetir cada 7 - 10 días si persisten las condiciones favorables.	8
TABACO	Mildíu Mancha anillada Pie negro	1.5 - 2.0 ó 150 - 250	Aplicar en plantas arraigadas después del trasplante. Se puede repetir a los 5 - 7 días, si persisten las condiciones.	-
AJO - CEBOLLA	Mildíu	1.5 - 2.0 ó 150 - 250	Aplicar en condiciones favorables a la enfermedad. Se puede repetir cada 7 - 10 días, si persisten las condiciones.	8
SANDÍA, MELÓN, ZAPALLO, PEPINO, DE ENSALADA	Mancha foliar Picada del fruto	1.5 - 2.0 ó 100 - 150	Aplicar al existir condiciones predisponentes a la enfermedad. Repetir cada 7 - 10 días, si persisten las condiciones.	8

P.R. (Periodo de reentrada): 24 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección o hasta que el follaje haya secado.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La dosis y frecuencia de aplicación dependen del clima, del grado de infestación de la enfermedad y del estado de desarrollo del cultivo.

Se aplica a campo abierto, evitando aplicar con lluvias y vientos fuertes.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Disuelva completamente la cantidad de **MOXAN MZ WP** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de la mezcla, el cual debe contener agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad de su capacidad. Complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

#### **EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA**

**MOXAN MZ WP** se puede aplicar con los equipos convencionales, los tanques se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Asegúrese que la aplicación se realice uniformemente. Verifique la calibración de los equipos y recuerde que ésta se hace más crítica al disminuir el volumen empleado por hectárea. Su forma de empleo es en aspersión foliar.

#### **COMPATIBILIDAD:**

**MOXAN MZ XP** no es compatible con productos fuertemente alcalinos.

#### **FITOTOXICIDAD:**

**MOXAN MZ WP** ha mostrado seguridad ya que no ha mostrado síntomas de fototoxicidad en el cultivo, si se siguen las indicaciones y la dosis recomendada

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.
- Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.
- En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito.

#### **GUÍA PARA EL MÉDICO**

- Síntomas de intoxicación: La ingestión genera diarrea, náusea y vómito. La inhalación genera dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y tos. El contacto con la piel y los ojos genera enrojecimiento, dermatitis y dolor. Otros: Nerviosismo, vértigo, visión borrosa, calambres y molestia en el pecho.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.
- Contraindicaciones: Alcohol.